



**Carboximetilcisteína / Clorfeniramina Maleato /
Dextrometorfano Bromhidrato**
Vía oral



INDICACIONES

LARITOX® Está indicado en el tratamiento de la tos irritativa aguda y crónica, tos de los estados gripales, así como en los procesos inflamatorios y alérgicos de las vías respiratorias superiores.

POSOLOGÍA

La dosis para niños de 2-6 años es de 2.5mL o CC (1/2 cucharadita) cada 8 horas por 5 días.

La dosis para niños de 6-12 años es de 5 mL o CC (1 cucharadita) cada 8 horas por 5 días.

La dosis para niños mayores de 12 años y adultos es de 10 mL o CC (1 cucharada) cada 8 horas por 5 días.

CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado en los procesos bronquiales asmáticos, en la insuficiencia renal o hepática y en casos de pacientes padecientes de úlcera péptica activa.

EFFECTOS ADVERSOS

Los efectos secundarios más frecuentes son de carácter sintomático y desaparecen al disminuir la dosis, entre los más comunes están: náuseas, mareos y somnolencia y algunas veces sequedad de la boca.

Las reacciones adversas descritas son:

Digestivas. Pueden aparecer fenómenos anticolinérgicos como náuseas, vómitos, sequedad de boca, diarrea y estreñimiento. Más rara es la aparición de anorexia.

Hepáticas. Ocasionalmente podría producirse hepatopatía con o sin ictericia.

Cardiovasculares. Hipertensión arterial, hipotensión en ancianos y taquicardia.

Neurológicas/psicológicas. La reacción adversa más común es la aparición de somnolencia. También pueden aparecer reacciones paradójicas de excitabilidad, con nerviosismo e insomnio, siendo especialmente frecuentes en niños y ancianos.

Genitourinarias. Retención urinaria.

Alérgicas/dermatológicas. Raramente reacciones de hipersensibilidad, con urticaria, erupciones exantemáticas, exceso de sudoración y reacciones de fotosensibilidad.

Oftalmológicas. Midriasis, visión borrosa, hipertensión ocular.

Sanguíneas. Anemia, anemia hemolítica, leucopenia con neutropenia o granulocitopenia y trombopenia. **Metabólicas.** Raramente hipoglucemia.

INTERACCIONES

Actividad anticolinérgica que puede ser potenciada por otros fármacos con efectos antimuscarínicos. El uso de inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAOs) está contraindicado conjuntamente con los antagonistas H1 de histamina incluyendo la clorfeniramina. Otros fármacos con actividad anticolinérgica son los antidepresivos tricíclicos, las fenotiazinas y benzotropina.

LARITOX® puede ocasionar una depresión severa del sistema nervioso central si se combina con otros fármacos que deprimen el SNC. La ingestión de bebidas alcohólicas durante el tratamiento con **LARITOX®** está contraindicada ya que el alcohol puede potenciar sus efectos sedantes. Puede interactuar con

FÓRMULA

	LARITOX® Jarabe
Carboximetilcisteína	150 mg.
Clorfeniramina Maleato	2.5 mg
Dextrometorfano Bromhidrato	5 mg
Vehículo c.s.p	5 mL

DESCRIPCIÓN

LARITOX® es una especialidad farmacéutica compuesta de varios principios activos que actúan contra el malestar de la gripe. Entre estas sustancias se encuentran un agente antitusivo (Dextrometorfano), un expectorante (Carboximetilcisteína) y un agente antihistamínico (clorfeniramina maleato).

Carboximetilcisteína es usada como un agente mucolítico en la terapia adjunta de los desórdenes del tracto respiratorio caracterizados y mucus viscoso.

Maleato de clorfeniramina es un antihistamínico clase H1, este fármaco antagoniza competitivamente los efectos de histaminas en los receptores H1, de modo que la respuesta constrictora a la histamina de los músculos lisos intestinales y bronquiales, es bloqueada.

Dextrometorfano es útil en el tratamiento de la tos no productiva crónica, pero no tiene actividad expectorante. El dextrometorfano se ha identificado como un antagonista de N-metil-D-aspartato (NMDA).



las penicilinas.

Antidepresivos (IMAO, ISRS). La administración conjunta de productos con fenilefrina o dextrometorfano junto con IMAO o ISRS podría dar lugar a graves reacciones adversas, incluso mortales. Se recomienda evitar la asociación y no administrar productos con dextrometorfano o fenilefrina hasta pasados al menos 14 días del tratamiento con el antidepresivo.

Coxibs. Los coxibs podrían aumentar las concentraciones plasmáticas de dextrometorfano.

Expectorantes y mucolíticos. La inhibición de la tos por el dextrometorfano podría dar lugar a una obstrucción pulmonar en caso de aumento del volumen o de la fluidez de las secreciones bronquiales.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No debe administrarse en conjunto con depresores del S.N.C, ni con bebidas alcohólicas. Administrarse con precaución en mujeres embarazadas.

Tos persistente o crónica, como en la asociada a asma, enfisema pulmonar o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El dextrometorfano empeora dichos procesos debido al aumento de la viscosidad de las secreciones, y a la inhibición de la tos. Se han descrito reacciones broncoespásticas al administrar paracetamol a pacientes asmáticos con alergia a salicilatos, por lo que se recomienda precaución especial en estos pacientes.

Epilepsia. Algunos antihistamínicos h1 se han asociado con la aparición de crisis convulsivas.

Dependencia. Aunque son muy raros, se han dado casos de dependencia a productos con dextrometorfano. Se recomienda extremar las precauciones y vigilar al paciente, sobre todo a los niños, por si aparecieran síntomas de abuso.

Se debe evitar la asociación entre productos con dextrometorfano y antidepresivos, dejando transcurrir al menos 14 días de descanso entre la administración de ambos fármacos.

MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano.

No se encuentran descritos síntomas de sobredosis. En caso de

administración de dosis elevadas podrá efectuarse lavado gástrico y promoverse el peristaltismo intestinal.

La sobredosis por dextrometorfano no suele producir síntomas graves, aunque es de esperar un aumento de la sedación.

PRESENTACIONES

LARITOX®: se presenta en caja con frasco conteniendo 120 mL.

CONSERVACIÓN: Protéjase de la luz. Conservar a temperatura menor a 30 °C.

LEYENDA DE PROTECCIÓN

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños.
Venta libre sin receta médica.